

Elektronisches Supplement 1. Itemkennwerte für den DGQ ( $N = 302$ )

Item-Nr.	Item	Sub-skala <sup>a</sup>	$M$	$SD$	Schiefe	Kurtosis	Item-schwierig-keit	Trennschärfe <sup>b</sup>
1	Es gibt mehrere Personen, mit denen ich mehrmals ausführlich über den Trauerfall gesprochen habe.	MB	2.05	0.99	-0.60	-0.86	.68	.59
2	Es ist mir wichtig, immer wieder von dem Trauerfall zu erzählen.	MB	1.31	1.03	0.29	-1.06	.44	.81
3	Je häufiger ich von dem Trauerfall erzähle, desto klarer wird das Geschehen für mich.	MB	1.29	1.05	0.24	-1.15	.43	.71
4	Ich denke wesentlich häufiger über den Trauerfall nach, als ich darüber spreche.	VS	2.12	0.97	-0.68	-0.77	.71	.54
5	Wenn ich von dem Trauerfall erzähle, dann schockiere ich meine Zuhörer nur.	VS	0.83	0.93	0.82	-0.35	.28	.54
6*	Meine Gefühle bezüglich des Trauerfalls muss ich mit mir selbst ausmachen.	VS	1.37	1.05	0.78	-1.15	.46	.53
7	Ich habe das Bedürfnis, sehr oft von dem Trauerfall zu sprechen.	MB	0.89	0.98	0.86	-0.29	.30	.78
8	Oft versagt meine Stimme, wenn ich von dem Trauerfall erzähle.	VS	0.92	1.02	0.80	-0.56	.31	.59
9	Ich erzähle häufig, wie hilflos ich mich nach dem Trauerfall gefühlt habe.	MB	0.74	0.89	1.04	0.18	.25	.51
10	Nachdem ich jemandem von dem Trauerfall erzählt habe, bin ich immer ganz erschöpft.	VS	0.83	0.91	0.78	-0.41	.28	.60
11rec	Es würde mir nicht weiterhelfen, wenn ich jemandem von dem Trauerfall erzählen würde.	MB	2.24	0.95	-1.04	-0.03	.75	.57

12	Ich finde es schwer, mit jemandem über den Trauerfall zu sprechen.	VS	0.86	0.95	0.84	-0.32	.29	.73
13	Ich finde nie die passende Gelegenheit, meine Gefühle bezüglich des Trauerfalls mitzuteilen.	VS	0.87	1.04	0.89	-0.51	.29	.64
14	Je häufiger ich von dem Trauerfall erzähle, desto besser kann ich meine Gefühle in Worte fassen.	MB	1.25	0.95	0.24	-0.90	.42	.66
15	Ich fühle mich extrem angespannt, während ich von dem Trauerfall erzähle.	VS	1.06	0.94	0.54	-0.62	.35	.66
16	Nachdem ich von dem Trauerfall erzählt habe, fühle ich mich ganz erleichtert.	MB	0.95	0.83	0.68	0.05	.32	.59
17	Es ist mir angenehmer, nicht über den Trauerfall zu sprechen.	VS	0.84	0.98	0.94	-0.22	.28	.50
18	Ich möchte meine/n Partner/in, meine Familie / Freunde nicht belasten, indem ich Ihnen von dem Trauerfall erzähle.	VS	0.95	1.01	0.77	-0.79	.32	.61
19rec	Es fällt mir sehr leicht, über den Trauerfall zu reden.	VS	1.80	1.00	-0.29	-1.03	.60	.62
20	Ich habe den Drang, immer wieder von dem Trauerfall zu berichten.	MB	0.65	0.88	1.23	0.61	.22	.68
21	Wenn ich von dem Trauerfall spreche, werde ich sehr traurig.	VS	1.75	0.97	-0.12	-1.08	.58	.61
22	Ich mache mir zwar viele Gedanken über den Trauerfall, spreche aber kaum darüber.	VS	1.16	1.04	0.51	-0.91	.39	.64
23*	Wenn ich von dem Trauerfall erzähle, dann bringe ich meine Zuhörer in eine unangenehme Situation.	VS	0.83	0.95	0.95	-0.09	.28	.64
24*	Wenn ich von dem Trauerfall spreche, fühle ich mich emotional aufgewühlt.	VS	1.55	0.98	0.08	-1.02	.52	.68

*Anmerkungen:*  $N$  = Stichprobengröße;  $M$  = Mittelwert (Skala: 0–3);  $SD$  = Standardabweichung; DGQ = Disclosure of Grief Questionnaire; VS = „Verschwiegenheit“; MB = „Mitteilungsbedürfnis“.

<sup>a</sup> Extraktionsmethode = Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO-) Maß = .88, Bartlett's Test,  $p < .001$ ; <sup>b</sup> Trennschärfe für jeweilige

Subskala; rec = Items zur Berechnung der Skalenwerte invertieren; \* neu generierte bzw. stärker veränderte Items im Vergleich zum Fragebogen zum Offenlegen von traumatischen Erfahrungen (FOT; Müller et al., 2000), wobei das ebenso neu generierte Item „Ich erzähle häufig, wie einsam ich mich nach dem Trauerfall gefühlt habe“ aufgrund zu geringer Itemschwierigkeiten von  $< .20$  eliminiert wurde.